

## Surdopedie 1. přednáška – úkoly a test

Úkol: <https://hearingtest.online/>

V testu postupujte podle pokynů bod po bodu, nejprve zkalibrujte zvuk ze sluchátek podle instrukce, pak proveďte vlastní měření. Použijte přitom sluchátka a změřte každé ucho zvlášť. Výsledek Vašeho audiologického vyšetření se Vám ukáže zakreslený v audiogramu. Pokud kliknete na tlačítko OVERLAY, získáte představu, jak je na tom Váš sluch v souvislosti s řečovým banánem (viz přednáška). Kliknete-li na tlačítko Print – Save – Bookmark, audiogram se zvětší a dole vlevo uvidíte možnost „print this page“ a audiogram se vytiskne.

**Do mailu mi prosím do 24.2. pošlete splněný domácí úkol ve formě:**

- Váš změřený audiogram, dejte ho do přílohy oskenovaný, nebo vyfocený
- Pod něj slovní popis stavu Vašeho sluchu podle tohoto audiogramu. Napište, zda jste u sebe zjistili ztrátu sluchu a jaká je (viz přednáška – dělení podle velikosti ztráty sluchu), zda slyšíte na obě uši stejně, které je lepší a které horší, jak slyšíte hluboké a vysoké frekvence, zda stejně, nebo zda se Vaše prahy sluchu na různých frekvencích liší)

**Test:**


1. S jakými profesemi spolupracuje surdopedie? Vyjmenujte jich co nejvíce.
2. Jaké je správné pořadí tří základních složek vedoucích ke kvalitní kompenzaci sluchu? (kompenzace – rehabilitace – diagnostika)
3. Jaké jsou dvě základní fyzikální vlastnosti zvuku? Jaké mají jednotky?
4. Prohlédněte si řečový banán v prezentacič. 1 ( pozor, jsou tam dva typy řečových banánů) a napište odhadovanou hlasitost a frekvenci těchto zvuků:

	Frekvence	Hlasitost
Motorová pila		
Kapající voda		
Šepot		
Štěkot psa		

5. Prohlédněte si řečový banán a napište odhadovanou hlasitost  
Šepot \_\_\_\_\_  
tichá řeč \_\_\_\_\_  
normální řeč \_\_\_\_\_  
křik \_\_\_\_\_
6. Dopíšte orientační rozmezí prahů sluchu u těchto vad:  
normální sluch \_\_\_\_\_

lehká nedoslýchavost 20 – 40 dB  
střední nedoslýchavost \_\_\_\_\_  
těžká nedoslýchavost \_\_\_\_\_  
velmi těžká nedoslýchavost 80-100 dB  
zbytky sluchu \_\_\_\_\_

7. U kterého z těchto typů vad sluchu nemůže nikdy dojít k zlepšení sluchu?  
Převodní  
Percepční - sensoneurální  
Smíšená/kombinovaná  
Centrální
8. U kterého z předchozích typů vad sluchu jen velmi těžko pomůže kompenzace sluchadlem nebo kochleárním implantátem?
9. Snazší vývoj řeči u dítěte je u prelingválních nebo u postlingválních vad sluchu?
10. Může být člověk neslyšící z důvodů opakovaných zánětů středouší?
11. Nejčastější příčinou vad sluchu jsou úrazy – meningitida – genetické vady - ototoxická antibiotika?
12. Do audiogramu zakreslete ztrátu vpravo 30 – 45 – 45 – 60 DB, vlevo 65 – 80 -100 – 100 dB



13. Které z uší z přechozího audiogramu slyší lépe?
14. Slyší některé z uší bez sluchadel šepot?
15. Slyší některé z uší běžnou mluvenou řeč?