

SURDOPEDIE 2

Úkol:

Rozmyslete téma eseje o problematice sluchového postižení

Jaké dvě otázky Vás napadly při sledování filmu?

Jaké dvě informace jste předtím neměli, co Vás překvapilo?

Test:

1. U kterého z těchto typů vad sluchu nemůže nikdy dojít k zlepšení sluchu?
Převodní
Percepční - sensoneurální
Smíšená/kombinovaná
Centrální
2. U kterého z předchozích typů vad sluchu jen velmi těžko pomůže kompenzace sluchadlem nebo kochleárním implantátem?
3. Může být člověk neslyšící z důvodů opakovaných zánětů středouší?
4. Nejčastější příčinou vad sluchu u dětí jsou úrazy – meningitida – genetické vady - ototoxická antibiotika? Seřadte podle četnosti.
5. Jednostranná vada sluchu závažně ztěžuje nebo znemožňuje: kvalitní poslech hudby, směrové slyšení, učení cizím jazykům, vzdělávání v běžné škole, bezděčné slyšení, porozumění řeči v hluku, orientaci sluchem v prostoru
6. U dědičných vad sluchu je běžnější, že
A/ má vadu sluchu více generací
B/ vada sluchu se objeví pouze v jedné generaci
7. Screening sluchu novorozenců se v ČR dělá v 50% porodnic, 95 % porodnic, 100 % porodnic
8. Screeningovou metodou číslo 1 je v ČR
 1. ABR
 2. OAE
 3. SSEP
9. V případě, že otoakustické emise jsou u mimika nevybavné, je vhodné stejné vyšetření opakovat ještě: jednou až dvakrát - ještě třikrát až čtyřikrát - opakovaně nejméně do 1 roku života dítěte.

10. Přiřadte adjektiva **O = objektivní** nebo **S = subjektivní** k těmto metodám vyšetření sluchu, ke každé metodě napište orientační věk, odkdy je možné ji dělat:

BERA (NN BERA, CERA)

Subjektivní tónová audiometrie - video

Slovní audiometrie /dětský percepční test

ERA-SSEP

Sluchové zkoušky, reaktometr

Audiometrie ve volném poli

Pozorování, videozáznam

VRA (podmíněná reakce na zvuk)

11. Statisticky přesnější metodou vyšetření sluchu je SSEP nebo BERA ?

12. Pravidlo 1 – 3 – 6 znamená:

V 1 měsíci screening, ve 3 měsících objektivní vyšetření, v 6 měsících sluchadla

V 1 měsíci screening, ve 3 měsících objektivní vyšetření a sluchadla, v 6 měsících raná péče

V 1 měsíci diagnóza, ve 3 měsících sluchadla, v 6 měsících raná péče