

## SURDOPEDIE CVIČNÝ TEST Č. 2

1. U kterého z těchto typů vad sluchu nemůže nikdy dojít k zlepšení sluchu?  
Převodní  
Percepční - sensoneurální  
Smíšená/kombinovaná  
Centrální
2. U kterého z předchozích typů vad sluchu jen velmi těžko pomůže kompenzace sluchadlem nebo kochleárním implantátem?
3. Snazší vývoj řeči u dítěte je u prelingválních nebo u postlingválních vad sluchu?
4. Může být člověk neslyšící z důvodů opakovaných zánětů středouší?
5. Nejčastější příčinou vad sluchu u dětí jsou úrazy – meningitida – genetické vady - ototoxická antibiotika? Seřadte podle četnosti.
6. Jakou koncovku má název nejčastějších ototoxických antibiotik?
7. Jaký typ cytostatika používaného pro léčbu některých nádorových onemocnění poškozuje sluch?
8. Jednostranná vada sluchu závažně ztěžuje nebo znemožňuje: kvalitní poslech hudby, směrové slyšení, učení cizím jazykům, vzdělávání v běžné škole, bezděčné slyšení, porozumění řeči v hluku, orientaci sluchem v prostoru
9. U dědičných vad sluchu je běžnější, že  
A/ má vadu sluchu více generací  
B/ vada sluchu se objeví pouze v jedné generaci
10. Screening sluchu novorozenců se v ČR dělá v 50% porodnic, 95 % porodnic, 100 % porodnic
11. Screeningovou metodou číslo 1 je v ČR
  1. ABR
  2. OAE
  3. SSEP
12. V případě, že otoakustické emise jsou u mimika nevybavné, je vhodné stejné vyšetření opakovat ještě: jednou až dvakrát - ještě třikrát až čtyřikrát - opakovaně nejméně do 1 roku života dítěte.
13. Přiřadte adjektiva **O = objektivní** nebo **S = subjektivní** k těmto metodám vyšetření sluchu, ke každé metodě napište orientační věk, odkdy je možné ji dělat:

BERA (NN BERA, CERA)

Subjektivní tónová audiometrie - video

Slovní audiometrie /dětský percepční test

ERA-SSEP

Sluchové zkoušky, reaktometr

Audiometrie ve volném poli

Pozorování, videozáznam

VRA (podmíněná reakce na zvuk)

14. Statisticky přesnější metodou vyšetření sluchu je SSEP nebo BERA ?

15. Pravidlo 1 – 3 – 6 znamená:

V 1 měsíci screening, ve 3 měsících objektivní vyšetření, v 6 měsících sluchadla

V 1 měsíci screening, ve 3 měsících sluchadla, v 6 měsících raná péče

V 1 měsíci diagnóza, ve 3 měsících sluchadla, v 6 měsících raná péče