

## SURDOPEDIE ÚKOL Č. 2 - kombinované studium

### Správné odpovědi

1. Jakou koncovku má název nejčastějších ototoxických antibiotik? **Mycin**
2. Jaký typ cytostatika používaného pro léčbu některých nádorových onemocnění poškozuje sluch? **Cisplatina**
3. Jednostranná vada sluchu závažně ztěžuje nebo znemožňuje: kvalitní poslech hudby, **směrové slyšení**, učení cizím jazykům, vzdělávání v běžné škole, **bezděčné slyšení**, **porozumění řeči v hluku**, **orientaci sluchem v prostoru**
4. U dědičných vad sluchu je běžnější, že  
A/ má vadu sluchu více generací  
B/ **vada sluchu se objeví pouze v jedné generaci**
5. Screening sluchu novorozenců se v ČR dělá v 50% porodnic, **95 % porodnic**, 100 % porodnic
6. Screeningovou metodou číslo 1 je v ČR
  1. ABR
  2. **OAE**
  3. SSEP
7. V případě, že otoakustické emise jsou u mimika nevybavné, je vhodné stejné vyšetření opakovat ještě: **jednou až dvakrát** - ještě třikrát až čtyřikrát - opakovaně nejméně do 1 roku života dítěte.
8. Přiřaďte adjektiva **O = objektivní** nebo **S = subjektivní** k těmto metodám vyšetření sluchu, ke každé metodě napište orientační věk, odkdy je možné ji dělat:  
  
BERA (NN BERA, CERA) **O**  
Subjektivní tónová audiometrie – video **S**  
Slovní audiometrie /dětský percepční test **S**  
  
ERA-SSEP **O**  
Sluchové zkoušky, reaktometr **S**  
Audiometrie ve volném poli **S**  
Pozorování, videozáznam **S**  
VRA (podmíněná reakce na zvuk) **S**
9. Statisticky přesnější metodou vyšetření sluchu je SSEP nebo BERA ? **BERA**

10. Kostní sluchadlo BAHA pracuje na principu:
- A. **Převedení zvukové vlny na vibrace**
  - B. Zesílení zvuku nad 60 dB
11. Přiřadte k sobě typ sluchové vady a nejvhodnější kompenzační pomůcku:
- A. **Velká převodní vada sluchu**
  - B. **Percepční nedoslýchavost**
  - C. **Těžká percepční vada sluchu**
- a. **kochleární implantát**
  - b. **sluchadla**
  - c. **kostní sluchadlo BAHA**
12. Jak dlouho by dítě **před kochleární implantací** mělo celodenně nosit sluchadla?
- A. Cca 6 týdnů
  - B. **Cca 6 měsíců**
  - C. Cca 2 roky
13. Dostat kochleární implantát co nejrychleji by měli především:
- A. **Lidé, kteří náhle ohluchli**
  - B. Neslyšící děti do 1 roku věku
14. Které z následujících bodů jsou **nezbytnými nebo velmi častými** důsledky **závažného sluchového postižení** u dětí (lze vybrat více možností):
- A. **Opožděný vývoj mluvené řeči**
  - B. **Nepřesná výslovnost**
  - C. Kognitivní opoždění
  - D. Sociální opoždění
  - E. Funkční analfabetismus
15. Dítě s velmi těžkou vadou sluchu a kvalitní kompenzací je z hlediska vzdělávacích potřeb spíše:
- A. Neslyšící
  - B. **Sluchově postižené**
  - C. neslyšící